

茶花的养殖方法和注意事项有哪些

光照

山茶为半阴性花卉，夏季需搭棚遮阴。立秋后气温下降，山茶进入花芽分化期，应逐渐使全株受到充足的光照。冬季应置于室内阳光充足处，若室内光线太弱，山茶则生长不良，并易得病虫害。

温度

山茶喜温暖，怕寒冷。室内温度不能低于 5℃。温度在 10~15℃ 的室内，其他措施得当，春节即可开花，花期可至 3 月份。湿度。一般冬季室内较干燥，应经常向山茶叶面喷水，以形成一个湿润的小气候。但阴雨天忌喷水。

浇水

冬季浇水要视室内温度而定，一般 3 天左右一次，保持盆土湿润，忌积水或浇半截水。用自来水应先在水桶中存放一两天，让氯气挥发掉。水中最好放百分之一的硫酸亚铁，以利于改善水质。

施肥

山茶喜肥。一般在上盆或换盆时在盆底施足基肥，秋冬季因花芽发育快，应每周浇一次腐熟的淡液肥，并追施 1~2 次磷钾肥，氮肥过多易使花蕾焦枯，开花后可少施或不施肥。

病虫害防治

茶花主要病害有轮纹病、炭疽病、枯梢病、叶斑病、烟煤病等，主要防治药剂有：退菌特 800 倍；多菌灵 500 倍；百菌清 800 倍；克霉灵 800 倍定期防治，花前要注意灰霉病、花枯病防治。茶花虫害以红蜘蛛、蚜虫、蚧壳虫、卷叶蛾、造桥虫为主，主要防治药剂用氯腈菊酯 15mL+水胺硫磷 20mL或久效磷 25mL兑 30 斤水喷雾。

1. 适时移植或换盆：茶花宜在阳历每年的 10 月至次年 2 月份换盆或移植，特别是 11 月为茶花移植的最佳季节，11 月以后，越晚移植，对植株恢复越不利。不少朋友喜欢在春节移苗，是茶花生长不好的主要原因之一。

2. 用疏松透气的土壤种茶花：疏松透气，呈弱酸性的土壤最适合茶花生长，最好带一定的肥力，如：“兰花土”、园土、红砂壤等，不管是盆植或地植，应尽量以这类土壤为介质。有人认为红土酸性强，就用红土种植茶花，其实红壤虽然呈酸性，但粘性强，透气性差，很不利于茶花生根。

3. 适合茶花生长的环境：原生的茶花多生长在半荫半阳的山间，所以盆栽的茶花应置于室外阳光照无法直射的地方，或室内阳光很充足的地方，把茶花随便置于室外阳光充足的地方或室内阴暗处，茶花都不可能长得好。

4. 水份管理“见干见湿”：茶花的生长习性很特别，既怕干，又怕涝，比较娇嫩，因而茶花的水份管理要求较高，应以“见干见湿”为原则，即：要等土壤看起来有点干才能浇水，而浇水一定要浇湿浇透。些朋友为防止茶花，经常让盆土保持很潮湿，往往容易造成烂根。

5. 薄肥勤施：茶花既喜肥，又怕肥，施肥上要特别小心，茶花的施肥应坚持“薄肥勤施”的原则，以 300-500 倍的浓度稀释肥液，每个月施肥一次为宜，秋冬季适应少少施肥，有急性的朋友为使茶花长得快，喜欢给茶花施重肥，往往适得反，造成肥害。

6. 狠心疏蕾：除个别品种外，多数茶花品种均比较容易结花苞，过多的花蕾会造成茶花植株衰弱，甚至死亡，对于花苞过多的茶花，应尽量在阳历的 9 月前疏蕾，可使茶花开出艳丽的花朵。以冠副 40 公分左右的中花型茶花品种（如：赤丹）为例，留 5-10 个花苞即可，如果是大花品种如：克瑞墨大牡丹、赛牡丹、帕克斯先生等，则留 3-5 个就行了。

7. 每年一次修剪：修剪可以茶花树型整齐漂亮，又可促进萌发新枝，起复壮作用，在每年茶花刚凋谢时（大约在 2 月底 3 月初时），应对茶花进行一次修剪，把树型修剪整齐，并剪去病枝弱枝。

茶花惧风喜阳、地势高爽、空气流通、温暖湿润、排水良好、疏松肥沃的砂质壤土，黄土或腐殖土。 pH5.5-6.5 最佳。适温在 20-32 之间，29 以上时停止生长，35 时叶子会有焦灼现象，要求有一定温差。环境湿度 70%以上，大部分品种可耐 -8 低温（自然越冬，云茶稍不耐寒），在淮河以南地区一般可自然越冬喜酸性土壤，并要求较好的透气性。

以利根毛发育，通常可用泥炭，腐锯木，红土，腐植土，或以上的混合基质栽培。茶花春秋冬三季可不遮阴，夏天可用 50%遮光处理。

看过“茶花的养殖方法和注意事项有哪些”的人还看了：